

Siglo XVIII

1703-1704, Augsburgo (Alemania); 1707, Bagnarea (Toscana, Italia); 1708-1710/1718-1721, Irlanda; 1709-1720, Italia, Alemania y Hungría; 1715, Pomerania (Polonia); 1722, Granada y Valencia (España); 1728, Prusia (Alemania); 1728, Valencia (España); 1728-1731, Irlanda, Inglaterra, Escocia; 1734-1744, Alemania (bordes el río Rhin), Polonia, Rusia; 1736-1739, México*; 1740, Suecia; 1740-1741, Irlanda, Londres; 1740-1742, Francia; 1741, Praga*; 1741-1742, Londres; 1741-1743, Baviera (Alemania); 1749-1750, México; 1750, Londres; 1755, Provençe (Francia); 1757-1767, Alemania, Francia, España, Italia; 1758, Silesia* (Polonia); 1760-1761, Francia; 1761-1763, México; 1764, Cataluña¹, Extremadura (España), Italia, Sicilia; 1765, México; 1767, Toscana, Romagna (Italia); 1769, Constantinopla; 1770, Moscú; 1770-1772, Bohemia, Moravia, Austria, Suiza, norte de Italia; 1783, Cataluña; 1785, Oxford (Inglaterra); 1785-1786, México 1788, Noruega; 1789-1790, México; 1797-1802, Irlanda.

¹ El doctor Masdeval, médico del rey de España informaba que la epidemia se manifestó principalmente en las poblaciones de Lleida, Solsona, Seu d'Urgell y Cardona.